

# 2020-21 School Year

## New York State Immunization Requirements for School Entrance/Attendance<sup>1</sup>

**NOTES:**

Children in a prekindergarten setting should be age-appropriately immunized. The number of doses depends on the schedule recommended by the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). Intervals between doses of vaccine should be in accordance with the ACIP-recommended immunization schedule for persons 0 through 18 years of age. Doses received before the minimum age or intervals are not valid and do not count toward the number of doses listed below. See footnotes for specific information for each vaccine. Children who are enrolling in grade-less classes should meet the immunization requirements of the grades for which they are age equivalent.

**Dose requirements MUST be read with the footnotes of this schedule**

Vaccines	Prekindergarten (Day Care, Head Start, Nursery or Pre-k)	Kindergarten and Grades 1, 2, 3, 4 and 5	Grades 6, 7, 8, 9, 10 and 11	Grade 12
<b>Diphtheria and Tetanus toxoid-containing vaccine and Pertussis vaccine (DTaP/DTP/Tdap)<sup>2</sup></b>	<b>4 doses</b>	<b>5 doses or 4 doses</b> if the 4th dose was received at 4 years or older or <b>3 doses</b> if 7 years or older and the series was started at 1 year or older	<b>3 doses</b>	
<b>Tetanus and Diphtheria toxoid-containing vaccine and Pertussis vaccine adolescent booster (Tdap)<sup>3</sup></b>		<b>Not applicable</b>	<b>1 dose</b>	
<b>Polio vaccine (IPV/OPV)<sup>4</sup></b>	<b>3 doses</b>	<b>4 doses or 3 doses</b> if the 3rd dose was received at 4 years or older		
<b>Measles, Mumps and Rubella vaccine (MMR)<sup>5</sup></b>	<b>1 dose</b>	<b>2 doses</b>		
<b>Hepatitis B vaccine<sup>6</sup></b>	<b>3 doses</b>	<b>3 doses</b> <b>or 2 doses</b> of adult hepatitis B vaccine (Recombivax) for children who received the doses at least 4 months apart between the ages of 11 through 15 years		
<b>Varicella (Chickenpox) vaccine<sup>7</sup></b>	<b>1 dose</b>	<b>2 doses</b>		
<b>Meningococcal conjugate vaccine (MenACWY)<sup>8</sup></b>		<b>Not applicable</b>	<b>Grades 7, 8, 9, 10 and 11: 1 dose</b>	<b>2 doses or 1 dose</b> if the dose was received at 16 years or older
<b>Haemophilus influenzae type b conjugate vaccine (Hib)<sup>9</sup></b>	<b>1 to 4 doses</b>	<b>Not applicable</b>		
<b>Pneumococcal Conjugate vaccine (PCV)<sup>10</sup></b>	<b>1 to 4 doses</b>	<b>Not applicable</b>		

1. Demonstrated serologic evidence of measles, mumps or rubella antibodies or laboratory confirmation of these diseases is acceptable proof of immunity to these diseases. Serologic tests for polio are acceptable proof of immunity only if the test was performed before September 1, 2019 and all three serotypes were positive. A positive blood test for hepatitis B surface antibody is acceptable proof of immunity to hepatitis B. Demonstrated serologic evidence of varicella antibodies, laboratory confirmation of varicella disease or diagnosis by a physician, physician assistant or nurse practitioner that a child has had varicella disease is acceptable proof of immunity to varicella.
  2. Diphtheria and tetanus toxoids and acellular pertussis (DTaP) vaccine. (Minimum age: 6 weeks)
    - a. Children starting the series on time should receive a 5-dose series of DTaP vaccine at 2 months, 4 months, 6 months and at 15 through 18 months and at 4 years or older. The fourth dose may be received as early as age 12 months, provided at least 6 months have elapsed since the third dose. However, the fourth dose of DTaP need not be repeated if it was administered at least 4 months after the third dose of DTaP. The final dose in the series must be received on or after the fourth birthday and at least 6 months after the previous dose.
    - b. If the fourth dose of DTaP was administered at 4 years or older, and at least 6 months after dose 3, the fifth (booster) dose of DTaP vaccine is not required.
    - c. For children born before 1/1/2005, only immunity to diphtheria is required and doses of DT and Td can meet this requirement.
    - d. Children 7 years and older who are not fully immunized with the childhood DTaP vaccine series should receive Tdap vaccine as the first dose in the catch-up series; if additional doses are needed, use Td or Tdap vaccine. If the first dose was received before their first birthday, then 4 doses are required, as long as the final dose was received at 4 years or older. If the first dose was received on or after the first birthday, then 3 doses are required, as long as the final dose was received at 4 years or older.
  3. Tetanus and diphtheria toxoids and acellular pertussis (Tdap) adolescent booster vaccine. (Minimum age for grade 6: 10 years; minimum age for grades 7 through 12: 7 years)
    - a. Students 11 years or older entering grades 6 through 12 are required to have one dose of Tdap.
    - b. In addition to the grade 6 through 12 requirement, Tdap may also be given as part of the catch-up series for students 7 years of age and older who are not fully immunized with the childhood DTaP series, as described above. In school year 2020-2021, only doses of Tdap given at age 10 years or older will satisfy the Tdap requirement for students in grade 6; however, doses of Tdap given at age 7 years or older will satisfy the requirement for students in grades 7 through 12.
    - c. Students who are 10 years old in grade 6 and who have not yet received a Tdap vaccine are in compliance until they turn 11 years old.
  4. Inactivated polio vaccine (IPV) or oral polio vaccine (OPV). (Minimum age: 6 weeks)
    - a. Children starting the series on time should receive a series of IPV at 2 months, 4 months and at 6 through 18 months, and at 4 years or older. The final dose in the series must be received on or after the fourth birthday and at least 6 months after the previous dose.
    - b. For students who received their fourth dose before age 4 and prior to August 7, 2010, 4 doses separated by at least 4 weeks is sufficient.
    - c. If the third dose of polio vaccine was received at 4 years or older and at least 6 months after the previous dose, the fourth dose of polio vaccine is not required.
    - d. Only trivalent OPV (tOPV) counts toward NYS school polio vaccine requirements. Doses of OPV given before April 1, 2016 should be counted unless specifically noted as monovalent, bivalent or as given during a poliovirus immunization campaign. Doses of OPV given on or after April 1, 2016 should not be counted.
  5. Measles, mumps, and rubella (MMR) vaccine. (Minimum age: 12 months)
    - a. The first dose of MMR vaccine must have been received on or after the first birthday. The second dose must have been received at least 28 days (4 weeks) after the first dose to be considered valid.
    - b. Measles: One dose is required for prekindergarten. Two doses are required for grades kindergarten through 12.
  - c. Mumps: One dose is required for prekindergarten. Two doses are required for grades kindergarten through 12.
  - d. Rubella: At least one dose is required for all grades (prekindergarten through 12).
6. Hepatitis B vaccine
- a. Dose 1 may be given at birth or anytime thereafter. Dose 2 must be given at least 4 weeks (28 days) after dose 1. Dose 3 must be at least 8 weeks after dose 2 AND at least 16 weeks after dose 1 AND no earlier than age 24 weeks (when 4 doses are given, substitute "dose 4" for "dose 3" in these calculations).
  - b. Two doses of adult hepatitis B vaccine (Recombivax) received at least 4 months apart at age 11 through 15 years will meet the requirement.
7. Varicella (chickenpox) vaccine. (Minimum age: 12 months)
- a. The first dose of varicella vaccine must have been received on or after the first birthday. The second dose must have been received at least 28 days (4 weeks) after the first dose to be considered valid.
  - b. For children younger than 13 years, the recommended minimum interval between doses is 3 months (if the second dose was administered at least 4 weeks after the first dose, it can be accepted as valid); for persons 13 years and older, the minimum interval between doses is 4 weeks.
8. Meningococcal conjugate ACWY vaccine (MenACWY). (Minimum age for grade 7: 10 years; minimum age for grades 8 through 12: 6 weeks).
- a. One dose of meningococcal conjugate vaccine (Menactra or Menveo) is required for students entering grades 7, 8, 9, 10 and 11.
  - b. For students in grade 12, if the first dose of meningococcal conjugate vaccine was received at 16 years or older, the second (booster) dose is not required.
  - c. The second dose must have been received at 16 years or older. The minimum interval between doses is 8 weeks.
9. Haemophilus influenzae type b (Hib) conjugate vaccine. (Minimum age: 6 weeks)
- a. Children starting the series on time should receive Hib vaccine at 2 months, 4 months, 6 months and at 12 through 15 months. Children older than 15 months must get caught up according to the ACIP catch-up schedule. The final dose must be received on or after 12 months.
  - b. If 2 doses of vaccine were received before age 12 months, only 3 doses are required with dose 3 at 12 through 15 months and at least 8 weeks after dose 2.
  - c. If dose 1 was received at age 12 through 14 months, only 2 doses are required with dose 2 at least 8 weeks after dose 1.
  - d. If dose 1 was received at 15 months or older, only 1 dose is required.
  - e. Hib vaccine is not required for children 5 years or older.
10. Pneumococcal conjugate vaccine (PCV). (Minimum age: 6 weeks)
- a. Children starting the series on time should receive PCV vaccine at 2 months, 4 months, 6 months and at 12 through 15 months. Children older than 15 months must get caught up according to the ACIP catch-up schedule. The final dose must be received on or after 12 months.
  - b. Unvaccinated children ages 7 through 11 months are required to receive 2 doses, at least 4 weeks apart, followed by a third dose at 12 through 15 months.
  - c. Unvaccinated children ages 12 through 23 months are required to receive 2 doses of vaccine at least 8 weeks apart.
  - d. If one dose of vaccine was received at 24 months or older, no further doses are required.
  - e. PCV is not required for children 5 years or older.
  - f. For further information, refer to the PCV chart available in the School Survey Instruction Booklet at: [www.health.ny.gov/prevention/immunization/schools](http://www.health.ny.gov/prevention/immunization/schools)

For further information, contact:

**New York State Department of Health  
Bureau of Immunization  
Room 649, Corning Tower ESP  
Albany, NY 12237  
(518) 473-4437**

**New York City Department of Health and Mental Hygiene  
Program Support Unit, Bureau of Immunization,  
42-09 28th Street, 5th floor  
Long Island City, NY 11101  
(347) 396-2433**

# Año escolar 2020-2021

## Requisitos de vacunación del estado de Nueva York para inscribirse y asistir a la escuela<sup>1</sup>

**NOTAS:**

Los niños que están en prekindergarten deben tener las vacunas correspondientes a su edad. La cantidad de dosis depende del programa recomendado por el Advisory Committee for Immunization Practices (Comité Asesor de Prácticas de Vacunación, ACIP). Los intervalos entre las dosis de vacunas deben corresponder al programa de vacunación recomendado por el ACIP para personas de 0 a 18 años. Las dosis administradas antes de la edad o de los intervalos mínimos no son válidas y no se tienen en cuenta al calcular la cantidad de dosis que se mencionan abajo. Consulte las notas al pie de página para obtener información específica sobre **cada** vacuna. Los niños que se inscriben en clases sin grado deben cumplir los requisitos de vacunación de los grados en los que podrían estar según su edad.

**Se DEBEN leer los requisitos de dosis con las notas al pie de página de este programa.**

Vacunas	Prekindergarten (guardería infantil, programa Head Start, guardería o prekindergarten)	Kindergarten y 1. <sup>o</sup> , 2. <sup>o</sup> , 3. <sup>o</sup> , 4. <sup>o</sup> y 5. <sup>o</sup> grado	6. <sup>o</sup> , 7. <sup>o</sup> , 8. <sup>o</sup> , 9. <sup>o</sup> , 10. <sup>o</sup> y 11. <sup>o</sup> grado	12. <sup>o</sup> grado
<b>Vacuna que tiene los toxoides diftérico y tetánico y vacuna contra la tos ferina (DTaP/DTP/Tdap/Td)<sup>2</sup></b>	<b>4 dosis</b>	<b>5 dosis o 4 dosis</b> si la 4. <sup>a</sup> dosis se administró a los 4 años o más o <b>3 dosis</b> si tiene 7 años o más y si la serie empezó cuando tenía 1 año o más		<b>3 dosis</b>
<b>Refuerzo de la vacuna que tiene los toxoides tetánico y diftérico y de la vacuna contra la tos ferina (Tdap) para adolescentes<sup>3</sup></b>		<b>No corresponde</b>		<b>1 dosis</b>
<b>Vacuna antipoliomielítica (IPV/OPV)<sup>4</sup></b>	<b>3 dosis</b>	<b>4 dosis o 3 dosis</b> si la 3. <sup>a</sup> dosis se administró a los 4 años o más		
<b>Vacuna contra sarampión, paperas y rubéola (MMR)<sup>5</sup></b>	<b>1 dosis</b>		<b>2 dosis</b>	
<b>Vacuna contra la hepatitis B<sup>6</sup></b>	<b>3 dosis</b>	<b>3 dosis</b> <b>o 2 dosis</b> de la vacuna contra la hepatitis B para adultos (Recombivax) para niños que recibieron las dosis en intervalos de, por lo menos, 4 meses entre los 11 y los 15 años		
<b>Vacuna contra la varicela<sup>7</sup></b>	<b>1 dosis</b>		<b>2 dosis</b>	
<b>Vacuna antimeningocócica conjugada (MenACWY)<sup>8</sup></b>		<b>No corresponde</b>	<b>7.<sup>o</sup>, 8.<sup>o</sup>, 9.<sup>o</sup>, 10.<sup>o</sup> y 11.<sup>o</sup> grado: 1 dosis</b>	<b>2 dosis o 1 dosis</b> si la dosis se administró a los 16 años o más
<b>Vacuna conjugada contra Haemophilus influenzae tipo B (Hib)<sup>9</sup></b>	<b>1 a 4 dosis</b>		<b>No corresponde</b>	
<b>Vacuna antineumocócica conjugada (PCV)<sup>10</sup></b>	<b>1 a 4 dosis</b>		<b>No corresponde</b>	

1. Una constancia serológica comprobada de anticuerpos contra el sarampión, las paperas o la rubéola o una confirmación de laboratorio de dichas enfermedades son pruebas aceptables de la inmunidad ante estas enfermedades. Las pruebas serológicas de detección de poliomielitis son una prueba aceptable de la inmunidad solo si la prueba se hizo antes del 1.<sup>o</sup> de septiembre de 2019 y los tres serotipos dieron positivo. Un análisis de sangre con resultado positivo para el anticuerpo de superficie contra la hepatitis B es una prueba aceptable de la inmunidad ante la hepatitis B. Una constancia serológica comprobada de anticuerpos contra la varicela, una confirmación de laboratorio de varicela o el diagnóstico de un médico, un asistente médico o un enfermero de práctica avanzada de que un niño tuvo varicela son pruebas aceptables de la inmunidad ante la varicela.
  2. Vacuna que tiene los toxoides diftérico y tetánico y vacuna contra la tos ferina acelular (DTaP). (Edad mínima: 6 semanas).
    - a. A los niños que comienzan la serie a tiempo se les debe administrar una serie de 5 dosis de la vacuna DTaP a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, entre los 15 y los 18 meses, y a los 4 años o más. La cuarta dosis puede administrarse a partir de los 12 meses, siempre que hayan transcurrido por lo menos 6 meses desde la tercera dosis. Sin embargo, no es necesario que se repita la cuarta dosis de DTaP si se administró al menos 4 meses después de la tercera dosis de DTaP. La dosis final de la serie debe administrarse en el cuarto cumpleaños o después y al menos 6 meses después de la dosis anterior.
    - b. Si la cuarta dosis de DTaP se administró a los 4 años o más, y al menos 6 meses después de la tercera dosis, la quinta dosis (refuerzo) de la vacuna DTaP no es obligatoria.
    - c. En el caso de los niños nacidos antes del 1/1/2005, solo se requiere que sean inmunes a la difteria, y las dosis de DT y Td cumplen este requisito.
    - d. A los niños de 7 años o más que no estén totalmente vacunados con la serie de vacunas DTaP para niños se les debe administrar la vacuna Tdap como la primera dosis en la serie de vacunas para ponerse al día; si se necesitan más dosis, debe administrarse la vacuna Td o Tdap. Si les administraron la primera dosis antes de su primer cumpleaños, deben administrarse 4 dosis, siempre que la dosis final se administre a los 4 años o más. Si les administraron la primera dosis el día de su primer cumpleaños o después, deben administrarse 3 dosis, siempre que la dosis final se administre a los 4 años o más.
  3. Refuerzo de la vacuna que tiene los toxoides tetánico y diftérico y de la vacuna contra la tos ferina acelular (Tdap) para adolescentes. (Edad mínima para 6.<sup>o</sup> grado: 10 años; edad mínima para 7.<sup>o</sup> a 12.<sup>o</sup> grado: 7 años).
    - a. A los estudiantes de 11 años o más que entran en 6.<sup>o</sup> a 12.<sup>o</sup> grado les deben administrar una dosis de Tdap.
    - b. Además del requisito para 6.<sup>o</sup> a 12.<sup>o</sup> grado, la vacuna Tdap también se puede administrar como parte de la serie de vacunas para ponerse al día a los estudiantes de 7 años o más que no estén totalmente vacunados con la serie de vacunas DTaP para niños, como se describió arriba. En el año escolar 2020-2021, solo las dosis de Tdap administradas a los 10 años o más cumplirán el requisito de Tdap para los estudiantes de 6.<sup>o</sup> grado; sin embargo, las dosis de Tdap administradas a los 7 años o más cumplirán el requisito para los estudiantes de 7.<sup>o</sup> a 12.<sup>o</sup> grado.
    - c. Los estudiantes de 10 años que entran a 6.<sup>o</sup> grado y a quienes no les administraron la vacuna de Tdap cumplen los requisitos hasta que tengan 11 años.
  4. Vacuna antipoliomielítica inactivada (IPV) o vacuna antipoliomielítica oral (OPV). (Edad mínima: 6 semanas).
    - a. A los niños que comienzan la serie a tiempo les deben administrar una serie de IPV a los 2 meses, a los 4 meses, entre los 6 y los 18 meses, y a los 4 años o más. La dosis final de la serie debe administrarse en el cuarto cumpleaños o después y al menos 6 meses después de la dosis anterior.
    - b. Los estudiantes a quienes les administraron la cuarta dosis antes de los 4 años y antes del 7 de agosto de 2010 solo necesitan 4 dosis con, al menos, 4 semanas de separación.
    - c. Si la tercera dosis de la vacuna antipoliomielítica se administró a los 4 años o más y, por lo menos, 6 meses después de la dosis anterior, la cuarta dosis no es obligatoria.
    - d. Solo la OPV triple (tOPV) se considera en los requisitos escolares de vacunación contra la poliomielitis del estado de Nueva York. Las dosis de OPV administradas antes del 1.<sup>o</sup> de abril de 2016 deben incluirse a menos que se indiquen específicamente como monovalentes, bivalentes o como administradas durante una campaña de vacunación contra el virus de la poliomielitis. Las dosis de OPV administradas el 1.<sup>o</sup> de abril de 2016 o después de esa fecha no deben incluirse.
  5. Vacuna contra sarampión, paperas y rubéola (MMR). (Edad mínima: 12 meses)
    - a. La primera dosis de la vacuna MMR debe haberse administrado en el primer cumpleaños o después. Para que se considere válida, la segunda dosis debe haberse administrado al menos 28 días (4 semanas) después de la primera dosis.
  - b. Sarampión: Se necesita una dosis para prekindergarten. Se necesitan dos dosis para kindergarten a 12.<sup>o</sup> grado.
  - c. Paperas: Se necesita una dosis para prekindergarten. Se necesitan dos dosis para kindergarten a 12.<sup>o</sup> grado.
  - d. Rubéola: Se necesita por lo menos una dosis para todos los grados (de prekindergarten a 12.<sup>o</sup> grado).
6. Vacuna contra la hepatitis B
    - a. La primera dosis puede administrarse en el nacimiento o en cualquier momento posterior. La segunda dosis debe administrarse al menos 4 semanas (28 días) después de la primera dosis. La tercera dosis debe administrarse al menos 8 semanas después de la segunda dosis Y al menos 16 semanas después de la primera dosis, PERO no antes de las 24 semanas (cuando se administren 4 dosis, reemplazar "cuarta dosis" por "tercera dosis" en estos cálculos).
    - b. Dos dosis de la vacuna contra la hepatitis B para adultos (Recombivax) administradas con, al menos, 4 semanas de separación entre los 11 y los 15 años cumplen el requisito.
  7. Vacuna contra la varicela. (Edad mínima: 12 meses)
    - a. La primera dosis de la vacuna contra la varicela debe haberse administrado en el primer cumpleaños o después. Para que se considere válida, la segunda dosis debe haberse administrado al menos 28 días (4 semanas) después de la primera dosis.
    - b. Para los niños menores de 13 años, el intervalo mínimo recomendado entre dosis es de 3 meses (si la segunda dosis se administró al menos 4 semanas después de la primera dosis, se puede aceptar como válido); para los niños de 13 años o más, el intervalo mínimo entre dosis es de 4 semanas.
  8. Vacuna antimeningocócica conjugada ACWY (MenACWY). (Edad mínima para 7.<sup>o</sup> grado: 10 años; edad mínima para 8.<sup>o</sup> a 12.<sup>o</sup> grado: 6 semanas).
    - a. Se necesita una dosis de la vacuna antimeningocócica conjugada (Menactra o Menveo) para los estudiantes que entran a 7.<sup>o</sup>, 8.<sup>o</sup>, 9.<sup>o</sup>, 10.<sup>o</sup> y 11.<sup>o</sup> grado.
    - b. Para los estudiantes de 12.<sup>o</sup> grado, si la primera dosis de la vacuna antimeningocócica conjugada se administró a los 16 años o más, la segunda dosis (refuerzo) no es obligatoria.
    - c. La segunda dosis debe haberse administrado a los 16 años o más. El intervalo mínimo entre dosis es de 8 semanas.
  9. Vacuna conjugada contra Haemophilus influenzae tipo B (Hib). (Edad mínima: 6 semanas).
    - a. A los niños que comienzan la serie a tiempo se les debe administrar la vacuna Hib a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, y entre los 12 y los 15 meses. Los niños mayores de 15 meses deben ponerse al día de acuerdo con el programa de actualización del ACIP. La dosis final debe administrarse a los 12 meses o después.
    - b. Si se administraron 2 dosis de la vacuna antes de los 12 meses, solo se requieren 3 dosis. La tercera dosis se administra entre los 12 y los 15 meses, al menos 8 semanas después de la segunda dosis.
    - c. Si la primera dosis se administró entre los 12 y los 14 meses, solo se requieren 2 dosis. La segunda dosis debe administrarse, al menos, 8 semanas después de la primera dosis.
    - d. Si la primera dosis se administró a los 15 meses o más, solo se requiere 1 dosis.
    - e. La vacuna Hib no es obligatoria para los niños de 5 años o más.
  10. Vacuna antineumocócica conjugada (PCV). (Edad mínima: 6 semanas).
    - a. A los niños que comienzan la serie a tiempo se les debe administrar la vacuna PCV a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, y entre los 12 y los 15 meses. Los niños mayores de 15 meses deben ponerse al día de acuerdo con el programa de actualización del ACIP. La dosis final debe administrarse a los 12 meses o después.
    - b. A los niños de 7 a 11 meses que no estén vacunados les deben administrar 2 dosis con, al menos, 4 semanas de separación, seguidas de una tercera dosis entre los 12 y los 15 meses.
    - c. A los niños de 12 a 23 meses que no estén vacunados les deben administrar 2 dosis de la vacuna con, al menos, 8 semanas de separación.
    - d. Si se administró una dosis de la vacuna a los 24 meses o más, no se requieren más dosis.
    - e. La PCV no es obligatoria para los niños de 5 años o más.
    - f. Para tener más información, consulte la tabla de PCV que está en el Folleto de instrucciones para encuestas escolares, en: [www.health.ny.gov/prevention/immunization/schools](http://www.health.ny.gov/prevention/immunization/schools).

Para tener más información, comuníquese con:

**New York State Department of Health  
Bureau of Immunization  
Room 649, Corning Tower ESP  
Albany, NY 12237  
(518) 473-4437**

**New York City Department of Health and Mental Hygiene  
Program Support Unit, Bureau of Immunization,  
42-09 28th Street, 5th floor  
Long Island City, NY 11101  
(347) 396-2433**